

# Apixabán (Eliquis):

## *Lo que usted necesita saber y hacer*

### ¿Qué es el apixaban?

**Apixabán (Eliquis)** es un **anticoagulante**. A veces, a los anticoagulantes se les conoce como “adelgazante de la sangre”. Ellos realmente no adelgazan la sangre. En su lugar:

- Detienen la acción de cierta proteína que el cuerpo necesita para coagular la sangre
- Detiene la formación de nuevos coágulos
- Evita que los coágulos sanguíneos se vuelvan más grandes, de tal manera que su cuerpo los pueda disolver con el tiempo

El apixabán no puede deshacer los coágulos que usted ya tiene.

### ¿Por qué lo necesito?

Por lo general, el apixabán se utiliza para:

- **El tratamiento de la fibrilación auricular.** La fibrilación auricular es un ritmo cardíaco anormal que puede causar la formación de coágulos sanguíneos en el corazón. Al prevenir la formación de coágulos, el apixabán puede prevenir un accidente cerebrovascular.
- **El tratamiento de la trombosis venosa profunda (DVT, por sus siglas en inglés) y la embolia pulmonar (PE, por sus siglas en inglés).** La DVT es un coágulo sanguíneo que se forma en la pierna. Puede liberarse y viajar a través del torrente sanguíneo hasta los pulmones, causando una PE. El apixabán puede prevenir la formación o crecimiento de coágulos y evitar que pedazos de este se liberen mientras el cuerpo se está sanando.
- **Prevención de coágulos de sangre.** Las personas a quienes se les ha practicado cirugía de reemplazo de cadera o de rodilla también utilizan el apixabán para prevenir la formación de coágulos de sangre en las piernas.

### ¿Cuándo y cómo se debe tomar?

- Tome el apixabán dos veces al día, con o sin alimentos.
- Tome el apixabán aproximadamente a la misma hora cada día, por ejemplo, con el desayuno o la cena.
- No deje de tomar el apixabán sin hablar con su proveedor de atención médica.

### ¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si se le olvida tomar una dosis de apixabán, tómelo tan pronto como sea posible en el mismo día, y luego continúe tomándolo dos veces al día. **NO tome más de una dosis de apixabán al mismo tiempo** para compensar la dosis que dejó de tomar.

### ¿El apixabán interactúa con otros medicamentos?

El apixabán interactúa con ciertos medicamentos, incrementando algunas veces su riesgo de sangrado.

**Hable siempre con su proveedor de atención médica o farmacéutico antes de empezar a tomar un nuevo medicamento o suplemento herbal.** Los medicamentos que pueden interactuar con el apixabán incluyen:

- Aspirina, productos que contienen aspirina u otros fármacos antiinflamatorios no esteroides (tales como ibuprofeno, naproxeno, Motril, Advil, Aleve, etc.)
- Carbamazepina (Tegretol)
- Claritromicina (Biaxin)
- Clopidogrel (Plavix)
- Fenitoína (Dilantin)
- Prasugrel (Effient)
- Rifampina (Rifadin)
- Hierba de San Juan
- Ticagrelor (Brilinta)
- Inhibidores de la proteasa/ antivirales (tales como boceprevir, indinavir, lopinavir, ritonavir o telaprevir)
- Los medicamentos antimicóticos que terminan con -azol (tales como ketoconazol o itraconazol)



## ¿Cuándo debería recibir ayuda médica?

### Llame su proveedor de atención médica si:

- Usted inicia, termina o cambia la dosis de cualquiera de los medicamentos enunciados [en la página anterior](#)
- Usted observa efectos secundarios, tales como malestar estomacal, ardor en el estómago, diarrea, dolor de cabeza, fatiga o mareo
- Usted se cae y se hace daño, especialmente si se golpea la cabeza
- Usted observa un aumento de cualquiera de las siguientes **señales de sangrado**:
  - Más hematomas de lo normal
  - Sangrado anormal por la boca, nariz o las encías
  - Orina rosada, roja o marrón oscuro
  - Sangrado leve o sangre roja brillante en sus heces
  - Incremento en el sangrado menstrual

### Llame al 911 o acuda a emergencias si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Un dolor de cabeza muy fuerte o cuello rígido que aparece súbitamente
- Evacuación intestinal con sangre, roja oscura, negra, como alquitrán, con mal olor o heces blandas
- Mareo, desmayo o debilidad de aparición súbita
- Dolor súbito en una articulación (como en el tobillo, rodilla, muñeca, codo, hombro o cadera)
- Visión borrosa de aparición súbita
- Frío o insensibilidad en un brazo o una pierna
- Dolor súbito en el pecho
- Dificultad para hablar o para mover un lado de su cuerpo

## ¿Presenta riesgos el apixabán?

Al igual que todos los medicamentos, el apixabán tiene riesgos y efectos secundarios. Puede incrementar su riesgo de sangrado. Consulte el panel de la derecha para aprender qué debe buscar y cuándo necesita acudir a la sala de emergencias.

## ¿Cómo se compara con la warfarina (Coumadin)?

Los estudios demuestran que en comparación con la warfarina o la aspirina, el apixabán es tan eficaz como la warfarina para el tratamiento de ciertas condiciones médicas. El apixabán también puede tener menos riesgo de sangrado que la warfarina.

- **Ventajas.** El apixaban no requiere pruebas en sangre frecuentes, no interactúa con los alimentos y tiene menos interacciones significativas con otros medicamentos.
- **Desventajas.** El apixabán solo está disponible bajo el nombre de marca **Eliquis**. Es más costoso porque no hay una opción genérica disponible. Tampoco hay un antídoto para revertir su acción.

**¿Es seguro durante el embarazo o la lactancia?** Las mujeres no deben tomar apixabán durante el embarazo o mientras estén amamantando. Si está embarazada o planea estarlo, hable con su médico antes de empezar a tomar apixabán.

**¿Como lo guardo?** Guárdelo en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños.

## ¿Quién NO debe tomar apixabán?

- No lo deben tomar las personas que son alérgicas al apixabán o que tengan problemas de sangrado, una válvula cardíaca mecánica o una enfermedad valvular cardíaca significativa, o una función renal deficiente.
- Es posible que las personas con una función renal deficiente puedan tomar apixabán en forma segura. Si usted tiene enfermedad renal, consulte con su proveedor de atención médica para asegurarse de que esté tomando la dosis correcta.

## ¿Cómo puedo prevenir el sangrado?

Para reducir el riesgo de sangrado abundante:

- **Consulte a su médico antes de realizar actividades donde tenga riesgo de lesiones, hematomas (moretones) o sangrado.** Algunos ejemplos son los deportes de contacto, deportes extremos o trabajo donde tiene que subir a una escalera o estar cerca de herramientas filosas.
- **Diga a su médico o dentista que está tomando apixabán por lo menos 1 semana (7 días) antes de someterse a un procedimiento dental o quirúrgico.**

*Apixaban (Eliquis): What you need to know and do*

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.

©2013–2018 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Hay más información disponible en [intermountainhealthcare.org](http://intermountainhealthcare.org). Patient and Provider Publications FS3905-04/18 (Last reviewed - 01/18 (Spanish translation 04/18 by inWhatLanguage)