

# Procedimiento MitraClip

## ¿Por qué necesito un procedimiento mitraclip?

El procedimiento mitraclip corrige un problema llamado **regurgitación de la válvula mitral**. La regurgitación de la válvula mitral es cuando partes de la válvula mitral, las valvas, no cierran por completo. Esto hace que la sangre fluya en retroceso en su corazón. Esta hoja indica los conceptos básicos que usted necesita saber.



## ¿Qué sucede durante un procedimiento mitraclip?

Durante el procedimiento mitraclip, el médico utiliza un catéter (tubo delgado flexible) para colocar un pequeño clip en las valvas de la válvula mitral. El clip ayuda a que la válvula cierre con más fuerza y evita que la sangre fluya en retroceso.



Esto debe aliviar sus síntomas y evitar que empeoren con el tiempo. El procedimiento mitraclip es una forma de corregir la válvula sin necesidad de cirugía a corazón abierto.



## ¿Cuáles son los beneficios del procedimiento mitraclip?

Su válvula mitral funcionará mejor. Esto puede aliviar los síntomas causados por la regurgitación de la válvula mitral, ayudándole a respirar mejor y ser más activo.

## Qué debe preguntarle a su médico sobre el procedimiento mitraclip

Pregúntele a su médico:

- Cómo puede ayudarle este procedimiento
- Si hay otros procedimientos o cirugías que le pueden ayudar
- Cuáles son los riesgos

Continúe haciendo preguntas hasta estar seguro de entender todos los riesgos y beneficios.

## ¿Cuáles son los riesgos y complicaciones posibles del procedimiento mitraclip?

Las complicaciones graves son poco frecuentes. Algunos riesgos y complicaciones posibles son:

- Regurgitación continua en la válvula mitral. Esto puede requerir otro procedimiento o cirugía.
- Daño al músculo o válvula del corazón. Esto puede requerir cirugía a corazón abierto para corregirlo.
- Sangrado, infección, o daño a un vaso sanguíneo donde se colocaron los catéteres en su cuerpo.
- Un ritmo cardíaco anormal.
- Coágulos de sangre.
- Un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.
- Reacción a la anestesia o al tinte.
- Muerte (poco frecuente).

## ¿Qué puedo hacer en lugar del procedimiento mitraclip?

La cirugía a corazón abierto puede ser otra forma de corregir su válvula mitral. No se recomienda para la gente con ciertos problemas de salud. También puede optar ser tratado únicamente con medicamentos. Vea el otro lado de este folleto para saber más sobre lo que sucede antes, durante y después del procedimiento.

## Antes del procedimiento

- Usted necesitará que alguien lo lleve al hospital el día de su procedimiento y llevarlo a su casa al día siguiente.
- No se le permite comer o beber nada la noche antes de ir al hospital, después de medianoche (12:00 AM).
- Usted no debe tomar ningún medicamento la noche antes de su procedimiento, después de la medianoche (12:00 AM).
- Los pacientes con diabetes son tratados en el hospital con la escala de deslizamiento de insulina.

## Durante el procedimiento


- El procedimiento toma de 2 a 4 horas.
- Se le da medicamento para ayudarlo a dormir.
- El médico hace una incisión pequeña (corte) en la ingle.
- Un tubo pequeño flexible llamado catéter se inserta a través de la abertura hasta su corazón.
- Se corta un pequeño agujero en la pared entre las cámaras del corazón (tabique).
- El catéter pasa a través de la incisión hasta la válvula mitral.
- El médico utiliza el catéter para colocar el mitraclip en las valvas de su válvula mitral.
- Se retira el catéter y se cierra la incisión en su ingle.

## Después del procedimiento

- Se le lleva a una sala de recuperación inmediatamente después del procedimiento.
- Usted deberá acostarse de espaldas por al menos 6 horas.
- Usted permanecerá en el hospital durante la noche.

## En el hogar

- Usted puede esperar una leve molestia en el área de la incisión por unos días.
- Usted necesita tomar sus medicamentos exactamente como su médico le ordenó para controlar el dolor y evitar infecciones.
- Es posible que necesite un laxante para el estreñimiento.
- Usted tendrá un vendaje en la ingle alrededor de 4 días. Deberá mantener el lugar limpio y seco.
- Usted no puede tomar un baño o ir a nadar hasta que el médico lo autorice.
- Usted no puede levantar nada que pese más que un galón de leche por varios días.
- Usted no puede hacer ninguna actividad en la que tenga que doblarse o estar en cuclillas por al menos una semana.
- Usted puede hacer ejercicios ligeros como caminar, pero no debe correr por al menos una semana.



Mitral Clip Procedure